



STATION POITOU-CHARENTES

000161 S.R.P.V.

13, ROUTE DE LA FORET

86580 BIARD

Bulletin n° 341 (07/97) 13 Mars 1997----

POIS: Grosse pression des sitones

COLZA : stade D2 à E.

CHARANCONS DE LA TIGE

Situation-Préconisation

On a dépassé le stade tige 20 cm; les colzas ne sont plus sensibles. Ne plus intervenir.

MELIGETHES

Situation

Le vol continue et se traduit par des captures importantes ; 1200 ont été enregistrées. Par contre, l'activité au champ est nulle puisque la plupart des parcelles bénéficient encore de la protection contre les charançons de la tige.

Préconisation

Quelques traitements spécifiques ont été réalisés notamnent après des protections précoces charançons de la tige.

Les traitements ne sont plus justifiés maintenant : seuil de 2 à 3 méligèthes par inflorescence et floraison en vue.

POIS : stade levée à 3 feuilles.

SITONES

Situation - Préconisation

Le temps est très favorable à l'activité des insectes qui occasionnent des morsures dès la levée. On atteint une note comprise entre 1 et 2 au stade 2 feuilles de la culture.

Un traitement est justifié sur la plupart des parcelles. (seuil : note 2 échelle de Cantot).

BLE: stade redressement - début montaison.

PIETIN- VERSE

L'absence de pluie bloque l'apparition de nouvelles contaminations secondaires et la progression du risque climatique.

Les préconisations du précédent bulletin restent valables.

ROUILLE BRUNE


La remontée sensible de l'indice de risque se poursuit en raison du maintien de températures élevées.

Les indications du dernier bulletin sont confirmées, des précisions complémentaires figureront dans les prochains bulletins.

ROUILLE JAUNE

- En Midi-Pyrénées, des attaques inhabituelles et précoces sont signalées sur la variété Victo (très sensible) mais également sur Soissons, Thésée et Récital.
- En cas d'observation de cette maladie, il serait nécessaire de nous prévenir afin que nous puissions effectuer des prélèvements d'échantillons pour identifier exactement la race de rouille jaune présente.

7,33



ORGE DE PRINTEMPS : stade 2 feuilles - tallage.

PUCERONS

Situation

La présence de pucerons est confirmée notamment en Charente-Maritime et en Sud Deux-Sèvres (où des infestations importantes sont signalées dans des parcelles semées fin novembre dont le peuplement a été affecté par le gel).

Préconisation

Intervenir en cas de présence ; une surveillance rigoureuse est nécessaire, les conditions climatiques restant favorables aux pucerons.

NOTE D'INFORMATION

relative aux mesures de retrait d'autorisation de vente de produits antiparasitaires annoncées par communiqué de presse du 29 janvier 1997 et publiées au J.O. du 15/02/1997 :

- atrazine, simazine, lindane : voir bulletin n° 339 du 27/02 ;
- autres substances.

Des mesures concernant les substances suivantes doivent faire l'objet de décisions notifiées avant le 01/07/1997 : diuron, DNOC, aldicarbe, diquat, paraquat, produits destinés aux amateurs.

Le point sur ces différentes mesures sera fait régulièrement dans les bulletins d'Avertissements Agricoles.

AVERTEL

La mise à jour 1997 et les dépliants habituels seront transmis aux abonnés la semaine prochaine.